

meridol® med CHX 0,2%

Hochwirksam bei mildem Geschmack

meridol® med CHX 0,2% Mundspülung ist ein Antiseptikum mit Chlorhexidindigluconat, das nachweislich Bakterien und Plaquebildung verringert und so die Ursache von Zahnfleischentzündungen bekämpft.*


Mit ihrem milden Geschmack und Minz-Aroma wurde sie speziell zur kurzzeitigen Keimzahlreduktion bei bakteriell bedingten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut sowie zur Anwendung nach parodontalchirurgischen Eingriffen entwickelt.



Ohne Alkohol



Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren geeignet



2 WOCHEN

300 ml Flasche – entspricht einer 2-wöchigen Anwendung

In Apotheken erhältlich



* Chlorhexidin 0,2% gilt als der Goldstandard unter den antibakteriellen Wirkstoffen zur oralen Anwendung.

meridol® med CHX 0,2%. Zur zeitweiligen Keimzahlreduktion in der Mundhöhle, als temporäre adjuvante Therapie zur mechanischen Reinigung bei bakteriell bedingten Entzündungen der Gingiva und der Mundschleimhaut sowie nach parodontalchirurgischen Eingriffen, bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand: 08/2023

meridol® SPEZIAL-ZAHNBÜRSTE

Zur kurzfristigen Anwendung während der Behandlung mit CHX



Runden Sie Ihre Zahnfleischpflege mit der **meridol® SPEZIAL-ZAHNBÜRSTE** ab. Für eine sanfte Reinigung und schonende Plaque-Entfernung.



Erhalten Sie Ihre Zahnfleischgesundheit nach der CHX Behandlung

Nach Beendigung der Chlorhexidin-Behandlung können Sie mit der täglichen Anwendung der **meridol® PARODONT EXPERT Zahnpasta und Mundspülung** weiterhin zur Stärkung der Widerstandskraft Ihres Zahnfleisches beitragen.



Fragen Sie Ihre Zahnärztin oder Ihren Zahnarzt nach **meridol® PARODONT EXPERT**



Scannen Sie, um mehr zu erfahren oder besuchen Sie www.meridol.de.

PROM10022





Erfahren Sie, wie Sie **gereiztes Zahnfleisch** nach Zahnbehandlungen **pflegen können**

meridol®


Wie entstehen Zahnfleischprobleme?

Eine unkontrollierte Ansammlung von Bakterien kann zu einer Entzündung des Zahnfleisches (Gingivitis) führen, die in der Folge schwere Schäden verursachen kann, wenn sie sich ausweitet.



Manchmal benötigen Sie eine höhere antibakterielle Wirksamkeit

Chlorhexidin (CHX) ist in der Zahnmedizin weit verbreitet. Zu den üblichen kurzfristigen Anwendungsbereichen gehören akute Zahnfleiscentzündungen, periimplantäre Erkrankungen, Wurzelkanalbehandlungen oder orale Eingriffe. CHX dient ebenso als Mundspülung zur Reduzierung von Mikroorganismen während zahnärztlicher Eingriffe.^{1,2}




Vor allem nach Zahnbehandlungen muss das Zahnfleisch vor Bakterien geschützt werden, um einen Anstieg der Entzündungsaktivität zu vermeiden. Deshalb wird Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt empfehlen, Chlorhexidin für einen kurzen Zeitraum zu verwenden.

1. Mathur S, et al. National Journal of Physiology, Pharmacy & Pharmacology, 2011.
2. Brookes ZLS, et al. J Dent. 2020;103:103497.

Die richtige Mundpflege ist entscheidend

Wenn Sie Chlorhexidin benötigen, ist es wahrscheinlich, dass Ihnen das Zähneputzen schwerfällt. Das Spülen mit Chlorhexidin kann Plaque und Bakterienablagerungen wirksam reduzieren, sollte aber das regelmäßige Zähneputzen nicht ersetzen.


- 1 Reinigen Sie Ihre Zahnzwischenräume entweder mit einer Interdentalbürste oder Zahnseide, um Nahrungspartikel aus den Zahnzwischenräumen zu entfernen.



- 2 Putzen Sie Ihre Zähne 2 bis 3 Mal täglich 2 Minuten lang gründlich mit einer antibakteriellen Zahnpasta und einer Zahnbürste mit weichen Borsten.



Achten Sie darauf, den Zahnfleischrand nicht auszulassen, denn dort sammelt sich oft Plaque an.



Anschließend spülen Sie Ihren Mund sorgfältig mit Wasser aus.

- 3 Spülen Sie Ihren Mund 60 Sekunden lang mit einer Chlorhexidin-Mundspülung.

